



## FAM 30

środek myjąco – dezynfekujący zawiera 2,75% aktywnego jodu  
posiada barwny indeks aktywności preparatu

### Typ: profesjonalny

**FAM 30** jest środkiem myjąco – dezynfekującym opartym na bazie kwasu siarkowego (9,3% wag.), kwasu fosforowego (9,5% wag.) i aktywnego jodu (2,75% wag.) Zawiera barwny indeks aktywności preparatu.

Wskazuje moment przejścia roztworu aktywnego – kolor brązowy w **nieaktywny – kolor czarny**.

Jest aktywny w obecności substancji organicznych. Ulega biodegradacji. Bezpieczny w użyciu.

### Zastosowanie:

**FAM 30** przeznaczony jest do mycia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętów w gospodarstwach mlecznych, fermach drobiowych, hodowli trzody chlewnej oraz innych pomieszczeniach inwentarskich.

### OCHRONA INWENTARZA

- **MYCIE POWIERZCHNI NIEPOROWATYCH** np. naczyń, wiader, tac wylęgowych, krat – stężenie robocze **0,25%**

- **DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI** o szerokim spektrum działania – stężenie **1:100** (stosując metodę zraszania do gruntownej dezynfekcji stosować ok. 7,8 cm<sup>3</sup> koncentratu na 1 m<sup>2</sup> powierzchni)

- **DEZYNFEKCJA NARZĘDZI** o szerokim spektrum działania – stężenie **1:100**

- **ODKAŻANIE NÓG I KÓŁ** przez zanurzenie w celu wspomaganie zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób stosować w proporcji **1: 180**. Wymieniać po zmianie koloru z brązowego na czarny lub codziennie jeżeli ulega silnemu zabrudzeniu. Przy zastosowaniu rozcieńczenia **1:80** trwałość 2 – 7 dni w zależności od intensywności ruchu.

- **DEZYNFEKCJA POWIETRZA** – fumigacja – rozcieńczyć w stosunku **1:500**. *FAM 30 może być stosowany do rozpylania w powietrzu w obecności inwentarza – stosować 2x w tygodniu. Stosować 14 ml roztworu / 1 m<sup>3</sup>*

- **UZDATNIANIE WODY PITNEJ DLA ZWIERZĄT** – zmieszać FAM 30 z wodą w proporcji **1:2500** – stosować jako lekarstwo przy braku łaknienia u ptaków

- **MYCIE KRÓW I KONI** w celu usunięcia pasożytów skóry **1:500** (może zabarwić sierść) stosować 1x w miesiącu

### Sposób użycia / dozowania:

Wymieszać z zimną wodą w sposób turbulentny. Stosować metodą: natrysku, zamaczania, zamgławiania, cyrkulacyjną w obiegach zamkniętych. Spłukać po myciu bądź dezynfekcji.

**Stężenie użytkowe:** myć w stężeniu **0,25% – 0,5%**

dezynfekcja: **1:100 – 1:600**

**Preparat został zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności, Sekretarza Stanu Szkocji i Sekretarza Stanu Walii jako środek dezynfekujący do celów określonych przez Ustawę o Ochronie Zdrowia Zwierząt z 1981 r i w odniesieniu do:**

**Rozporządzeń o zwalczaniu Pryszczycy 1:550**

**Rozporządzeń o zwalczaniu Choroby Pęcherzykowej Świń 1:600**

**Rozporządzenia o Chorobach Drobiu 1:125**

**Rozporządzeń o gruźlicy 1:30**

**Ogólnych rozporządzeń do Ustawy o Zdrowiu Zwierząt 1:180**

**Czas dezynfekcji :** 15 minut

**Trwałość:** w zamkniętym opakowaniu – 3 lata

Nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca i wysokiej temperatury.

Nie stosować na aluminium i jego stopy.

**Opakowanie:** 25L

**Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 0951/04 kat. 1 gr. 2,3,4**

## FAM 30

### UŻYTKOWE STĘŻANIA PRODUKTU W CHOWIE ŚWIŃ

#### Zakażenia bakteryjne:

|       |  |
|-------|--|
| 1:150 | Zanikowe zapalenie nozdrzy                         |
| 1:150 | Zanikowe zapalenie nozdrzy/Zanikowa pastereleza    |
| 1:100 | Zakażenie pałeczkami okrężnicy. Obrzęk jelita      |
| 1:95  | Zapalenie pęcherza/ Odmiedniczkowe zapalenie nerek |
| 1:100 | Zapalenie jelit / PIA                              |
| 1:116 | Zapalenie sutka / Zapalenie nozdrzy                |
| 1:100 | Salmonelloza                                       |
| 1:30  | Gruźlica   |

#### Zakażenia wirusowe:

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 1:200 | Afrykańska cholera świń           |
| 1:125 | Choroba Aujeszkyego               |
| 1:180 | PRRS / Choroba sina ucha          |
| 1:180 | Gorączka świń                     |
| 1:125 | Wścieklizna                       |
| 1:600 | Pryszczyca świń                   |
| 1:550 | Choroba kończyn i nozdrzy         |
| 1:40  | Zakażne zapalenie żołądka i jelit |

#### Zakażenia grzybicze:

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 1:100 | Mikotoksykoza                       |
| 1:100 | Biegunka prosiąt                    |
| 1:100 | Grzybica wywołana przez dermatofity |
| 1:100 | Grzyb figówkowy                     |

Dystrybutor : NorDen SP. z o.o. ul. Półanki 23 tel. 012/658-48-70; fax. 012/658-53-14; tel. kom. 0691/712-290